

# Les injections "stop chaleurs" chez les furettes

Texte : Stéphanie PIAZZA  
(Tiré d'une réponse sur un forum furet  
= infos en vrac)

On lit toujours "les injections c'est pas bon"... Déjà faut savoir de quoi on parle.... "Les injections" ça existe pas...  
Tout dépend du produit qui est employé !!!

A la base le produit le plus courant en médecine véto c'est la progestérone (et ses dérivés) et ça, oui c'est dangereux pour une furette !!!!!  
Pour la bonne et simple raison que de la progestérone sur une furette qui a un taux très élevé d'oestrogène, ça provoque une fermeture du col de l'utérus et un très grand risque de pyomètre (infection purulente de l'utérus) et cela peut être très grave !

Mais il y d'autres types d'injections "stop chaleur" qui n'ont pas ces risques !

Il y a par exemple la GnRH ou l'hCG qui provoquent exactement la même réaction hormonale que lors d'un accouplement (le réaction hormonale qui déclenche l'ovulation est la même).

Si le dosage est bon, il n'y a pas plus de risques que lors d'un accouplement non fertile... La furette fera ensuite une pseudo gestation (plus ou moins longue et plus ou moins marquée).

Vous me direz "bah alors, il est ou le problème ???"

Le problème est que ces molécules ne sont beaucoup moins utilisées en médecine vétérinaire, et sont destinés aux animaux de rente (bovins...). Beaucoup de véto ne savent pas qu'on peut utiliser ce type de molécules pour cette indication et sont assez réticents à utiliser des molécules n'ayant des AMM que pour les animaux de rente.

De plus je pense que cela nécessite de la part du véto une bonne connaissance que ce qu'il fait (faïres les bons dosages, au bon moment etc...) et donc une bonne connaissance de la physiologie du furet.

Perso, moi j'utilise des injections chez mes furettes depuis plusieurs années et je n'ai jamais eu un seul problème... Ni même de problème repro ensuite (j'ai toujours de très belles portées, et pour le moment pas de problèmes !!)

Il existe aussi un autre protocole (assez récent) qui conciste a faire des injections de faibles doses de LH tous les mois (pendant le période de repro) ce qui sert à mettre l'ovaire de la furette en "repo" et éviter donc qu'elle ne tombe en chaleurs...

C'est assez difficile à mettre en place en pratique car cela veut dire aller tous les mois chez le véto... avoir le produit (qui est cher et ne se conserve pas) dispo tous les mois ....

Par contre, je ne conseillerai ce type d'injections qu'à des gens prêts à assumer à fond et qui sont très attentifs à leurs furets....

Il faut faire les injections au bon moment, aller chez un véto qui sais ce qu'il fait et savoir réagir si jamais il y avait un problème (et aussi.... être prêt à supporter une femelle en pseudo gestation !!!)

Pour le moment aucun effet néfaste n'est connu chez le furet avec ce type d'injections et les doses sont faibles....

Le but est de reproduire artificiellement le pic de LH qui a lui suite au coït et qui déclenche l'ovulation... Si la dose est bonne, l'effet est le même qu'avec un accouplement non fécondant...

J'en saurai plus sur les évolutions de ces types de méthodes dans quelques mois, après le symposium sur les furets en Hollande, il y a une conférence qui parlera de l'alternative à la stérilisation.....

Pour rappel, si il est parfois conseillé d'utiliser les injections d'hormones, c'est parce que la stérilisation peut avoir des conséquences sur la santé à venir du furet ( Voir : <http://www.infofuret.com/pdf/La%20sterilisation%20du%20furet%20et%20ses%20consequences.pdf> )

Article sur la corrélation entre l'âge de la stérilisation et l'hypercorticisme (= problème surrénalien) : <http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2003-1128-094343/c7.pdf>

Le Dr N.J. Schoemaker, de la faculté d'Utrecht, travail actuellement sur ce sujet et cherche des alternatives à la stérilisation chez le furet.

Il donnera une conférence sur ses recherches lors du 2<sup>ème</sup> symposium Européen sur le furet, à Utrecht en octobre 2006.

### **Questions – Réponses :**

#### **Citation:**

Mais après une pseudo gestation les chaleurs peuvent revenir ? Donc faudrait à nouveau faire une injection je suppose ?

Oui ! En moyenne il faut prévoir 2 injections par an.... (parfois 1.... parfois 3...)

#### **Citation:**

Est-ce que ce sont 2 protocoles différents (citation 1 et 2) ?

Oui c'est ce que j'explique... là on attend pas que la furette tombe en chaleurs... on empêche les chaleurs par des injections tous les mois...

**Citation:**

Justement que doit on surveiller ? Je suis attentive à mes puces mais ne m'y connaissant pas du tout en repro j'ai un peu de mal à comprendre tout ça

Comme je l'ai expliqué ce type de solution n'est envisageable qu'avec des gens ultra volontaire... qui feront tout au moment ou il faut (au moment ou on leur dira...) qui rateront pas les moment de l'injection, qui changeront pas d'avis en cours de route, etc....

Mais aussi qui s'occupent assez et qui connaissent bien leur furette pour voir si jamais elle n'allait pas bien.... (au cas d'une éventuelle infection... il faut voir que la furette a peut etre des pertes et qu'elle va moins bien que d'habitude....) c'est pas envisageable pour des gens qui font pas spécialement attention....

C'est du jour le jour....

Mais aussi et surtout.... il faut que la personne ai un bon véto qui sait ce qu'il fait...

**Citation:**

A quel type de problème d'ordre médical peut on être confronté dans ces cas là ?

Les problèmes médicaux qu'on peut envisager (et je répète y'a pas de certitude que le risque est plus important en pseudo) c'est une infection du vagin ou de l'utérus... Avec sûrement écoulement vaginaux et la furette qui va moins bien....

Mais c'est surtout le suivi qui est nécessaire....

**Citation:**

Une femelle en pseudo gestation est donc à isoler du groupe au calme dans une cage à part si possible dans une autre pièce...

Non non, pas forcément !! Dans les cas les pires oui... mais c'est rare ! la seule que j'ai du séparer.... c'est Princesse qui a du etre séparée de Dakar (car elle lui arrachait tous les poils....) mais avec les autres femelles.... pas de soucis !!!

Par contre elle était insupportable, elle démontais les barreaux, me feulait dessus dès que je me fachaït..., faisait que des conneries, ne mangeai presque pas... faisait des nids avec ses peluches etc....

**Citation:**

Mais à partir de quel moment peut on définir que la pseudo est terminée (doit on se baser sur les 42 jrs de gestations) ?

Le syndrome de pseudo commence surtout en fin de ce qui serai la gestation (plus ou moins 40 jours apres l'injection), mais il peut commencer avant.... En moyenne cela dure 40 à 60 jours....

**Citation:**

Quel facteur va déclencher chez la furette la fin de cette pseudo puisqu'elle n'accouche pas ?

Cela reste un mystère.... mais pendant le syndrome de pseudo... c'est plutôt le fait qu'elle cherche ses bébés "imaginaires".... et qu'elle va mater des peluches etc....  
La fin... c'est en fait la diminution des hormones au cours du temps.... Car tout ce comportement n'est uniquement régi que par les hormones....

**Citation:**

A quelle date précise sait-on qu'on doit faire cette injection ? Dès que la vulve commence à gonfler ?

Tout dépend du produit... mais par exemple pour la GnRH c'est en moyenne 10 à 15 jours après le début des chaleurs (donc à partir du moment où la vulve a commencé à grossir)

Y'a encore des "spé" qui font de la progestérone.... et vous diront peut-être qu'il n'y a pas de risques....

Moi au vu de l'action physiologique de la molécule, vu mes cours d'obstétrique et vu les cas de pyométrie qu'a eue le Dr B. suite à ça.... bah je déconseille fortement... Maintenant... chacun son avis....